

檔 號：
保存年限：

農業部農糧署 函

地址：54044南投縣南投市光華路8號
承辦人：朱慧敏
電話：049-2332380分機1027
傳真：049-2341116
電子信箱：chm1212@mail.afa.gov.tw

受文者：全民儲碳股份有限公司

發文日期：中華民國113年6月17日
發文字號：農糧企字第1131109111號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：如文（1131012681-來文.pdf、A公告pdf檔-阿巴汀.pdf、A公告附件pdf檔-阿巴汀.pdf）

主旨：函轉農業部公告修正「阿巴汀」農藥使用方法及其範圍案，請查照。

說明：依據農業部113年5月31日農授防字第1131876031號書函（如附件）辦理。

正本：環球國際驗證股份有限公司、中華驗證有限公司、采園生態驗證有限公司、國立中興大學農產品驗證中心、成大智研國際驗證股份有限公司、國立屏東科技大學農水產品檢驗與驗證中心、安心國際驗證股份有限公司、雲嘉國際驗證股份有限公司、暉凱國際檢驗科技股份有限公司、財團法人農業科技研究院、環虹錕騰科技股份有限公司、台灣食農安全檢驗股份有限公司、藍鵲驗證服務股份有限公司、朝陽科技大學、彩虹大地有限公司、亞瑞仕國際驗證股份有限公司、全民儲碳股份有限公司、稻香驗證有限公司、奕嘉國際有限公司


副本：財團法人全國認證基金會、本署企劃組(均含附件)



檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年5月31日
發文字號：農授防字第1131876031A號



主旨：公告修正「阿巴汀」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

公告事項：新增之2%(w/w)阿巴汀水懸劑係變更自2%(w/w)阿巴汀乳劑之濃度表示方式。

部長 陳駿季

「阿巴汀」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 5 月 31 日農授防字第 1131876031A 號公告修正

一、變更安全劑型一覽表

農藥名稱	登記廠商名稱	變更日期	備註
2% 阿巴汀 SC	安旺特股份有限公司	113 年 5 月 31 日	本藥劑係 2%阿巴汀EC 轉換為更安全劑型

二、「阿巴汀」農藥使用方法與範圍一覽表

2%(w/w) 阿巴汀 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	稻細蟎	0.5 公升	2,000	分蘗盛期施藥 1 次，孕穗期至抽穗前再施藥 1 次。		共 2 次		30	採收前至少 30 天停止施藥。	
包葉菜類	番茄斑潛蠅	0.4-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	14			6		
十字花科包葉菜類	小菜蛾	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
十字花科包葉菜類	黃條葉蚤	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
小葉菜類	番茄斑潛蠅	0.4-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	14			6		
豌豆	潛蠅類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15	適用於葉用豌豆。	
十字花科小葉菜類	小菜蛾	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
十字花科小葉菜類	黃條葉蚤	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
芥藍	銀葉粉蝨	1-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	2		10		
茄科小葉菜類	斑潛蠅類	0.5-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
茄科小葉菜類	蚜蟬類	0.25-0.75 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			12		
蔥科小葉菜類	葉蟬類	0.38-0.5 公升	2,000	害蟬發生初期(當葉蟬每葉達3-5 隻)開始施藥。	7	共 2 次		10		
甘藷	葉蟬類	0.5-2 公升	1,000	害蟬發生時開始施藥。	7			3		
豆薯	潛蠅類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
樹薯	葉蟬類	0.5-2 公升	1,000	害蟬發生時開始施藥。	7			3		
山藥	葉蟬類	0.5-2 公升	1,000	害蟬發生時開始施藥。	7			3		
十字花科根菜類	小菜蛾	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
十字花科根菜類	黃條葉蚤	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
牛蒡	斑潛蠅類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			3		
茄科根菜類	斑潛蠅類	0.5-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
茄科根菜類	蚜蟬類	0.25-0.75 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			12		
蔥科根菜類	葉蟬類	0.38-0.5 公升	2,000	害蟬發生初期(當葉蟬每葉達3-5 隻)開始施藥。	7	共 2 次		10		
芋	葉蟬類	0.4-0.6 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			15		
茄科果菜類	斑潛蠅類	0.5-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
茄科果菜類	蚜蟬類	0.25-	2,000	害蟬發生時開	7			12		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
菜類		0.75 公升		始施藥。						
番茄	番茄斑潛蠅	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
茄子	二點小綠葉蟬	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			3		
茄子	二點葉蟎	0.5-0.6 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			3		
枸杞	銹蟬類	0.25-0.75 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			12		
秋葵	粉蝨類	0.6-1.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	2		12		
大豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於毛豆。	
花豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
樹豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
豌豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
菜豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
菜豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
蠶豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
扁豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
翼豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
刀豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
豇豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
瓜果類	銀葉粉	1-1.7 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
	蝨	升		始施藥。						
瓜果類	番茄斑潛蠅	0.45-0.6公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	14			6		
草莓	二點葉蟎	0.5-1公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			3		
葡萄	銹蟎類	0.4-0.8公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			3		
桑樹	銹蟎類	0.4-0.8公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			3		
柑桔類	銹蟎類	1公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。		1-2		6		
花木	粉蝨類	0.6-1.2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7				限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
菊	斑潛蠅類	0.1-0.3公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
菊	斑潛蠅類	0.25-0.5公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7				適用於觀賞花卉。	
茉莉	葉蟎類	0.67-1.67公升	1,500	害蟎發生時開始施藥。	7			7		
茶	銹蟎類	0.5-1.5公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			14		
破布子	銹蟎類	0.45-1.0公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			3		
蘭科作物	檢疫處理			檢疫處理時施藥1次。					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	
果苗	檢疫處理			檢疫處理時施藥1次。					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	

2%(w/w) 阿巴汀 水基乳劑 (EW)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
包葉菜類	番茄斑潛蠅	0.4-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	14			6		
十字花科包葉菜類	小菜蛾	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
十字花科包葉菜類	黃條葉蚤	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
小葉菜類	番茄斑潛蠅	0.4-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	14			6		
豌豆	潛蠅類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15	適用於葉用豌豆。	
十字花科小葉菜類	小菜蛾	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
十字花科小葉菜類	黃條葉蚤	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
芥藍	銀葉粉蝨	1-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	2		10		
茄科小葉菜類	斑潛蠅類	0.5-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
茄科小葉菜類	蚜蟬類	0.25-0.75 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			12		
蔥科小葉菜類	葉蟬類	0.38-0.5 公升	2,000	害蟬發生初期(當葉蟬每葉達3-5 隻)開始施藥。	7	共 2 次		10		
甘藷	葉蟬類	0.5-2 公升	1,000	害蟬發生時開始施藥。	7			3		
豆薯	潛蠅類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
樹薯	葉蟬類	0.5-2 公升	1,000	害蟬發生時開始施藥。	7			3		
山藥	葉蟬類	0.5-2 公升	1,000	害蟬發生時開始施藥。	7			3		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		升		始施藥。						
十字花科根菜類	小菜蛾	0.25-0.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
十字花科根菜類	黃條葉蚤	0.4-0.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
牛蒡	斑潛蠅類	0.3-1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			3		
茄科根菜類	斑潛蠅類	0.5-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
茄科根菜類	蚜蟬類	0.25-0.75公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			12		
蔥科根菜類	葉蟎類	0.38-0.5公升	2,000	害蟎發生初期(當葉蟎每葉達3-5隻)開始施藥。	7	共2次		10		
芋	葉蟎類	0.4-0.6公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			15		
茄科果菜類	斑潛蠅類	0.5-2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
茄科果菜類	蚜蟬類	0.25-0.75公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			12		
番茄	番茄斑潛蠅	0.5-1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
茄子	二點小綠葉蟬	0.25-0.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			3		
茄子	二點葉蟎	0.5-0.6公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			3		
枸杞	銹蟎類	0.25-0.75公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			12		
秋葵	粉蝨類	0.6-1.0公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	2		12		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
大豆	夜蛾類	0.3-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於毛豆。	
花豆	夜蛾類	0.3-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
樹豆	夜蛾類	0.3-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
豌豆	夜蛾類	0.3-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
菜豆	夜蛾類	0.3-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
菜豆	夜蛾類	0.3-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
蠶豆	夜蛾類	0.3-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
扁豆	夜蛾類	0.3-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
翼豆	夜蛾類	0.3-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
刀豆	夜蛾類	0.3-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
豇豆	夜蛾類	0.3-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
瓜果類	銀葉粉蝨	1-1.7公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
瓜果類	番茄斑潛蠅	0.45-0.6公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	14			6		
草莓	二點葉蟎	0.5-1公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			3		
葡萄	銹蟎類	0.4-0.8公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			3	避免於開花期使用。	
桑樹	銹蟎類	0.4-0.8公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			3		
柑桔類	銹蟎類	1公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。		1-2		6		
花木	粉蝨類	0.6-1.2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7				限觀賞花卉使用，使用	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									前宜先進行小面積藥害測試。	
菊	斑潛蠅類	0.1-0.3公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
菊	斑潛蠅類	0.25-0.5公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7				適用於觀賞花卉。	
茉莉	葉蟎類	0.67-1.67公升	1,500	害蟎發生時開始施藥。	7			7		
茶	銹蟎類	0.5-1.5公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			14	避免於開花期使用。	
破布子	銹蟎類	0.45-1.0公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			3		
蘭科作物	檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次。					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	
果苗	檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次。					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	

0.011(%) (w/w) 阿巴汀 餌劑 (RB)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
作物園	紅火蟻	2-4 公斤					<ol style="list-style-type: none"> 1. 大面積處理時，於火蟻覓食區，利用撒佈器均勻撒佈。 2. 獨立蟻丘處理沿蟻丘周圍1公尺內撒佈。 		<ol style="list-style-type: none"> 1. 餌劑應儘早使用。 2. 春秋季之早晨或傍晚（冬季上午 10 時至下午 3 時）地表溫度 21°C 至 38°C 時，施用在入侵火蟻活動覓食區。 3. 施用餌劑時地表須乾燥，若施用後 12 小時內下雨應重新施藥，且餌劑施放後 24 小時內勿灌溉。 4. 禁止將餌劑與其他物質如肥料等混合使用。 	

2%(w/w) 阿巴汀 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	稻細蟎	0.5 公升	2,000	分蘖盛期施藥 1 次，孕穗期至抽穗前再施藥 1 次。		共 2 次		30	採收前至少 30 天停止施藥。	變更安全劑型
包葉菜類	番茄斑潛蠅	0.4-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	14			6		
十字花科包葉菜類	小菜蛾	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
十字花科包葉菜類	黃條葉蚤	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
小葉菜類	番茄斑潛蠅	0.4-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	14			6		
豌豆	潛蠅類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15	適用於葉用豌豆。	
十字花科小葉菜類	小菜蛾	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
十字花科小葉菜類	黃條葉蚤	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
芥藍	銀葉粉蝨	1-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	2		10		
茄科小葉菜類	斑潛蠅類	0.5-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
茄科小葉菜類	蚜蟬類	0.25-0.75 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			12		
蔥科小葉菜類	葉蟎類	0.38-0.5 公升	2,000	害蟎發生初期(當葉蟎每葉達 3-5 隻)開始施藥。	7	共 2 次		10		
甘藷	葉蟎類	0.5-2 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥。	7			3		
豆薯	潛蠅類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開	7			15		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		公升		始施藥。						
樹薯	葉蟬類	0.5-2 公升	1,000	害蟬發生時開始施藥。	7			3		
山藥	葉蟬類	0.5-2 公升	1,000	害蟬發生時開始施藥。	7			3		
十字花科根菜類	小菜蛾	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
十字花科根菜類	黃條葉蚤	0.4-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
牛蒡	斑潛蠅類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			3		
茄科根菜類	斑潛蠅類	0.5-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
茄科根菜類	螞蟬類	0.25-0.75 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			12		
蔥科根菜類	葉蟬類	0.38-0.5 公升	2,000	害蟬發生初期(當葉蟬每葉達3-5 隻)開始施藥。	7	共 2 次		10		
芋	葉蟬類	0.4-0.6 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			15		
茄科果菜類	斑潛蠅類	0.5-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
茄科果菜類	螞蟬類	0.25-0.75 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			12		
番茄	番茄斑潛蠅	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
茄子	二點小綠葉蟬	0.25-0.5 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			3		
茄子	二點葉蟬	0.5-0.6 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			3		
枸杞	銹蟬類	0.25-	2,000	害蟬發生時開	7			12		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		0.75 公升		始施藥。						
秋葵	粉蝨類	0.6-1.0 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	2		12		
大豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於毛豆。	
花豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
樹豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
豌豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
菜豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
菜豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
蠶豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
扁豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
翼豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
刀豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
豇豆	夜蛾類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7	適用於鮮豆。	
瓜果類	銀葉粉蝨	1-1.7 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
瓜果類	番茄斑潛蠅	0.45-0.6 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥。	14			6		
草莓	二點葉蟎	0.5-1 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			3		
葡萄	銹蟎類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			3		
桑樹	銹蟎類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			3		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
柑桔類	銹蟬類	1 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。		1-2		6		
花木	粉蝨類	0.6-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7				限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
菊	斑潛蠅類	0.1-0.3 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
菊	斑潛蠅類	0.25-0.5 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥。	7				適用於觀賞花卉。	
茉莉	葉蟎類	0.67-1.67 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥。	7			7		
茶	銹蟬類	0.5-1.5 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			14		
破布子	銹蟬類	0.45-1.0 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			3		
蘭科作物	檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次。					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	
果苗	檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次。					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	